



# Vogelparadies Feisneck

Müritz-  
Nationalpark





Foto: indukas/stock.adobe.com

## Höckerschwan *Cygnus olor*

### **Merkmale:**

- Einer der größten Wasservögel
- Hals beim Schwimmen oft leicht s-förmig gebogen
- Orangeroter Schnabel, Federkleid weiß
- Großer schwarzer Stirnhöcker
- Laute Flügelgeräusche beim Fliegen
- Langer Schwanz (im Vergleich zu Sing- und Zwergschwan) besonders beim Gründeln gut erkennbar; Gründeln = Nahrungssuche durch Eintauchen von Kopf und Vorderkörper ins Wasser

### **Schon gewusst?**

Jungschwäne meist mit graubraunem Gefieder und einem dunklen Schnabel ohne Höcker.

Brütet an allen Gewässerarten.



Foto: MindestensM/  
stock.adobe.com

## Stockente *Anas platyrhynchos*

### Merkmale:

- Im Vergleich zu anderen Entenarten: groß und kräftig
- Seitlich: Blauer, weiß eingefasster Streifen (bei Enten „Spiegel“ genannt)
- ♀ Schnabel orange mit unregelmäßigem, dunklem Fleck auf der Oberseite; Federkleid dunkelbraun gemustert
- ♂ Schnabel gelb, Kopf metallisch grün, schmaler weißer Halsring, Brust braun, restliches Federkleid hellgrau

### Schon gewusst?

Erpel (männliche Enten) von Juli bis August ohne Prachtkleid mit grünem Kopf wegen Federwechsel. Brütet an Gewässern, teils auch mehrere Kilometer abseits von diesen.




Foto: EinBlick/stock.adobe.com

## Reiherente *Aythya fuligula*

### Merkmale:

- Kleiner als Stockente; gedrungener Körper mit schlankem Hals
- Relativ großer runder Kopf, hinten mit Federschopf
- Schnabel grau
- Augen gelb
- ♀ Federkleid dunkelbraun, die Seiten sind heller
- ♂ Schwarz, an den Seiten weiße Färbung

### Schon gewusst?

Ernährt sich vorwiegend von Muscheln und Schnecken. Brütet in schilfumstandenen Gewässern.



Foto: Sander Meertins/  
stock.adobe.com

## Haubentaucher *Podiceps cristatus*

### **Merkmale:**

- Ähnliche Größe wie Stockente
- Prachtkleid (Frühjahr): auffällige Federbüschel am Kopf, teilw. backenbartähnlich
- Hals lang, dünn, vorne weiß gefärbt
- Schnabel dünn und hellrosa
- Rückengefieder dunkel

### **Schon gewusst?**

Zur Balz im Frühjahr aufwendiges Werben umeinander, z. B. aufgerichtet im Wasser, Brust an Brust, beim „Pinguin-Tanz“. Brütet in schilfumstandenen Gewässern, baut teilweise Schwimmnester.




Foto: John Sandoy/  
stock.adobe.com

## Schellente *Bucephala clangula*

### Merkmale:

- Kleiner als Stockente, kompakt
- Rundlicher Kopf, wie ein Knauf auf kurzem Hals sitzend
- Schnabel grau, kurz
- Augen gelb
- ♀ Kopf braun, Körper graubraun
- ♂ Schwarzer Kopf mit grünem Glanz, Federkleid
- Weiß mit schwarzem Rücken, ein weißer Fleck jeweils zwischen Auge und Schnabel

### Schon gewusst?

Kann bis zu 8 Meter tief tauchen. Brütet vorrangig in Baumhöhlen an klaren Waldseen.




Foto: R. Vitt

## Blässhuhn *Fulica atra*

### Merkmale:

- Etwas größer als Teichhuhn, Körper rund, breit
- Kopf klein, schwarz
- Schwanz kurz
- Federkleid dunkelgrau
- Stirnschild und Schnabel weiß
- Augen rot

### Schon gewusst?

Nickt beim Schwimmen mit dem Kopf. Läuft mit seinen kräftigen Beinen zum Auffliegen über das Wasser. Brütet an Gewässern mit viel Ufervegetation.




Foto: Joefrei

## Eisvogel *Alcedo atthis*

### **Merkmale:**

- Etwas größer als Spatz, gedrungen
- Kopf relativ groß
- Schnabel sehr lang, hauptsächlich schwarz
- Schwanz und Beine kurz
- Federkleid schimmernd blau, Unterseite und Wangen orange

### **Schon gewusst?**

Fliegt schnell und niedrig übers Wasser. Sitzt häufig am schattigen Gewässerufer, bevor er blitzschnell ins Wasser schießt, um seine Beute zu fangen. Brütet in Steiluferhöhlen an fischreichen Gewässern.



Foto: EcoView/stock.adobe.com

**Graureiher**  
*Ardea cinerea*

**Merkmale:**

- Ähnliche Größe wie Storch, kräftig
- Federkleid oben mittelgrau und unten weißgrau
- Schmuckfeder am Hinterkopf, im Gegensatz zu Silberreiher
- Schnabel gerade, graugelb
- Beine lang, gelblich

**Schon gewusst?**

Fliegt wie der Silberreiher mit langsamen Flügelschlägen und eingezogenem Hals (s-förmig).  
Brütet bevorzugt auf alten Bäumen.



Foto: Wolfgang Kruck/  
stock.adobe.com

## Silberreiher

*Ardea alba*

### **Merkmale:**

- Schmäler als Graureiher
- Federkleid weiß
- Keine Schmuckfeder am Hinterkopf, im Gegensatz zum Graureiher
- Schnabel gelb, im Frühjahr schwarz
- Beine lang, dunkel

### **Schon gewusst?**

Fliegt wie der Graureiher mit langsamen Flügelschlägen und eingezogenem Hals (s-förmig).  
Brütet in großen Schilfflächen an größeren Seen.



Foto: rudiernst/stock.adobe.com

## Kormoran

*Phalacrocorax carbo*

### **Merkmale:**

- Etwa gänsegroß
- Federkleid schwarz, im Sonnenlicht schimmernd
- Weiße Kehle
- Schnabel kräftig, mit gelblicher Unterseite
- Langer, kräftiger Hals

### **Schon gewusst?**

Breitet nach dem Tauchgang seine Flügel weit aus wie einen Fächer, um sein Gefieder zu trocknen.  
Brütet auf Bäumen in der Nähe von großen Gewässern.

